


Dagbok över biverkningar av XALKORI (krizotinib)





Din läkare har ordinerat ett läkemedel som heter XALKORI® för behandling av lungcancer. Denna dagbok är tänkt att användas för att kunna skriva upp eventuella biverkningar. Ta sedan med dig dagboken vid ditt återbesök och berätta om du upplevt några biverkningar. Läs också bipacksedeln som medföljer förpackningarna med XALKORI®.


Du kan också läsa mer om din sjukdom och din behandling på webbsidan www.xalkoripatient.se








Egna anteckningar




A large white rectangular box with a thin black border, containing ten horizontal dotted lines for writing notes.

Egna anteckningar



A large white rectangular box with a thin black border, containing ten horizontal dotted lines for writing notes.

Egna anteckningar



A large white rectangular box with a thin black border, containing ten horizontal dotted lines for writing notes.

Var kan du få hjälp med information?

Du kan läsa mer om din sjukdom och din behandling på patienthemsidan: www.xalkoripatient.se



Lungcancerföreningen, www.lungcancerforeningen.se

Kontaktuppgifter till din läkare:

Xalkori® (krizotinib) hårda kapslar, 200 mg, 250 mg. **Läs informationen i läkemedlets bipacksedel.**

Xalkori® förskrivs av läkare och används för behandling av vuxna med en typ av lungcancer som kallas icke-småcellig lungcancer, och som har en specifik förändring eller defekt i antingen en gen som kallas anaplastiskt lymfomkinas (ALK) eller en gen som kallas ROSI. Läkaren kan ordinera XALKORI som initial behandling vid lungcancer som är i ett framskridet sjukdomsstadium eller då sjukdomen är långt gången och tidigare behandling inte varit tillräcklig för att kontrollera sjukdomen. XALKORI används för behandling av barn och ungdomar (i åldern 6 år till yngre än 18 år) med en typ av tumör som kallas anaplastiskt storcellslymfom (ALCL) eller en typ av tumör som kallas inflammatorisk myofibroblastisk tumör (IMT). Vid IMT finns det en specifik förändring eller defekt i en gen som kallas anaplastiskt lymfomkinas (ALK). XALKORI kan förskrivs till barn och ungdomar för behandling av ALCL om tidigare behandling inte varit tillräcklig för att stoppa sjukdomen. XALKORI kan förskrivs till barn och ungdomar för behandling av IMT om kirurgi inte varit tillräcklig för att stoppa sjukdomen. **Xalkori ska inte användas** vid allergi mot krizotinib eller mot något hjälpämne i detta läkemedel eller vid allvarig leversjukdom. **Tala med läkare eller sjuksköterska** innan användning om du har haft mild eller måttlig leversjukdom, om du någonsin haft andra lungproblem, om du fått veta att du har förlängt QT-intervall, om du har sänkt hjärtfrekvens, om du någonsin har haft magtarmsbesvär såsom håll i magen eller tarm eller om du har en sjukdom som orsakar inflammation i buken eller om du har spridning av cancer i buken, synrubbingar eller en allvarlig njursjukdom. Tala med din läkare efter att du tagit XALKORI om du upplever svåra magsmärtor, feber, frössa, andfåddhet, hög puls, förändrade toalettvanor eller förlorar synen helt eller delvis (i det ena eller båda ögonen). Berätta även för din läkare vilka övriga läkemedel du står på. **Datum för senaste översyn av bipacksedeln oktober 2022.**